

TERAPIA AMBULATORIALE PRECOCE DEL COVID-19: UN'ANALISI RETROSPETTIVA DI 392 CASI IN ITALIA

 Marco Cosentino , Veronica Vernocchi , Stefano Martini ,  Franca Marino , Barbara Allasino , Maria Balzola , Fabio Burigana , Alberto Dallari , Carlo Servo Florio Pagano , Antonio Palma , Mauro Rango

doi: <https://doi.org/10.1101/2022.04.04.22273356>

Questo articolo è un preprint e non è stato certificato da peer review [cosa significa?]. Riporta nuove ricerche mediche che devono ancora essere valutate e quindi non dovrebbero essere utilizzate per guidare la pratica clinica.

**Astratto**

Informazioni/Cronologia

Metrica

 Anteprima PDF**Pdf by:**
<https://www.pro-memoria.info>

Astratto

Introduzione - La pandemia della sindrome respiratoria acuta grave (SARS)-coronavirus-2 (CoV-2) malattia 2019 (COVID-19) è stata dichiarata a marzo 2020. La conoscenza della fisiopatologia del COVID-19 ha presto fornito una forte motivazione per l'uso precoce di farmaci antinfiammatori, antiplastrinici e anticoagulanti, tuttavia l'evidenza è stata solo lentamente e parzialmente incorporata nelle linee guida istituzionali. Le esigenze insoddisfatte dei pazienti ambulatoriali COVID-19 sono state presto prese in carico da reti di medici e ricercatori, che hanno sviluppato approcci farmacoterapeutici basati sulle migliori esperienze disponibili. Metodi - Il presente studio osservazionale retrospettivo indaga le caratteristiche, la gestione e gli esiti di un campione di pazienti COVID-19 assistiti in Italia da medici volontari all'interno dell'Associazione IppocrateOrg, una delle principali reti di assistenza internazionale, tra il 1 novembre 2020 e il 31 marzo 2021. Risultati - Dieci medici hanno preso parte allo studio e hanno fornito dati su 392 pazienti COVID-19 consecutivi. L'età media dei pazienti era di 48,5 anni (range: 0,5-97). Erano per il 51,3% femmine e sono state accudite quando erano in fase COVID-19 0 (15,6%), 1 (50,0%), 2a (28,8%), 2b (5,6%). Molti pazienti erano in sovrappeso (26%) o obesi (11,5%), con comorbidità croniche (34,9%), principalmente cardiovascolari (23%) e metaboliche (13,3%). I farmaci più frequentemente prescritti includevano: vitamine e integratori (98,7%), aspirina (66,1%), antibiotici (62%), glucocorticoidi (41,8%), idrossiclorochina (29,6%), enoxaparina (28,6%), colchicina

(8,9%), ossigenoterapia (6,9%), ivermectina (2,8%). Il ricovero è avvenuto nel 5,8% dei casi totali, principalmente nei pazienti assistiti allo stadio 2b (27,3%). Complessivamente, 390 pazienti (99,6%) sono guariti, un paziente (0,2%) è stato perso al follow-up e un paziente (0,2%) è deceduto dopo il ricovero. Un medico ha riportato una reazione avversa al farmaco (ADR) di grado 1 (disturbo transitorio o lieve) e 3 medici hanno riportato in totale 8 ADR di grado 2 (limitazione dell'attività da lieve a moderata). Conclusioni - Questo è il primo studio che descrive atteggiamenti e comportamenti dei medici che si prendono cura dei pazienti ambulatoriali COVID-19 e l'efficacia e la sicurezza del trattamento precoce del COVID-19 nel mondo reale. La letalità COVID-19 nella nostra coorte è stata dello 0,2%, mentre la letalità complessiva COVID-19 in Italia nello stesso periodo è stata compresa tra il 3% e il 3,8%. L'uso dei singoli farmaci e delle combinazioni di farmaci descritti in questo studio appare quindi efficace e sicuro, come indicato dalle poche e lievi reazioni avverse segnalate.

Dichiarazione di interesse concorrente

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

Gli autori non hanno dichiarato alcun interesse concorrente.

Dichiarazione di finanziamento

Questo studio non ha ricevuto alcun finanziamento.

Dichiarazioni d'autore

Confermo che tutte le linee guida etiche pertinenti sono state seguite e sono state ottenute le necessarie approvazioni da parte dell'IRB e/o del comitato etico.

sì

Di seguito sono riportati i dettagli dell'IRB/organismo di vigilanza che ha fornito l'approvazione o l'esenzione per la ricerca descritta:

Il Comitato Etico/IRB dell'Università dell'Insubria (Varese, Italia) ha dato l'approvazione etica per questo lavoro.

Confermo che è stato ottenuto tutto il consenso paziente/partecipante necessario e che sono stati archiviati i moduli istituzionali appropriati e che eventuali identificatori paziente/partecipante/campione inclusi non erano noti a nessuno (es. personale ospedaliero, pazienti o partecipanti stessi) al di fuori della ricerca gruppo quindi non può essere utilizzato per identificare gli individui.

sì

Comprendo che tutti gli studi clinici e qualsiasi altro studio interventistico prospettico devono essere registrati in un registro approvato dall'ICMJE, come ClinicalTrials.gov. Confermo che qualsiasi studio di questo tipo riportato nel manoscritto è stato registrato e viene fornito l'ID di registrazione dello studio

(nota: se si pubblica uno studio prospettico registrato retrospettivamente, fornire una dichiarazione nel campo ID dello studio spiegando perché lo studio non è stato registrato in anticipo) .

sì

Ho seguito tutte le linee guida appropriate per la rendicontazione della ricerca e ho caricato le liste di controllo relative alla rendicontazione della rete EQUATOR e altro materiale pertinente come file supplementari, se applicabile.

sì

Carta nella raccolta Preprint COVID-19 SARS-CoV-2 da medRxiv e bioRxiv

Diritto d'autore

Il titolare del copyright per questa pre stampa è l'autore/finanziatore, che ha concesso a medRxiv una licenza per visualizzare la pre stampa in perpetuo. È reso disponibile con una licenza internazionale CC-BY-NC-ND 4.0 .

[^Torna in cima](#)

[← Precedente](#)

[Prossimo →](#)

Inserito il 05 aprile 2022.

[📄 Scarica il pdf](#)

[✉ E-mail](#)

[☑ Opzioni di stampa/salvataggio](#)

[↻ Condividere](#)

[☑ Dichiarazioni d'autore](#)

[🌐 Strumenti di citazione](#)

[📄 Materiale supplementare](#)

[📄 Dati/Codice](#)

[Tweet](#)

Preprint COVID-19 SARS-CoV-2 da medRxiv e bioRxiv

Aree tematiche

Tutti gli articoli

Medicina delle dipendenze

Allergia e immunologia

Anestesia

Medicina Cardiovascolare

Odontoiatria e Medicina Orale

Dermatologia

Medicina d'emergenza