

Il vaccino COVID di Pfizer causa VAIDS nei bambini, lo studio dimostra

I bambini vaccinati diventano suscettibili alle infezioni batteriche e fungine
I bambini vaccinati diventano suscettibili alle infezioni batteriche e fungine

PDF by:
<https://www.pro-memoria.info>

Molti di noi hanno condiviso aneddoti di persone care vaccinate con i vaccini COVID-19 - e che in seguito soffrono di ogni sorta di malattie non correlate. Conosco un giovane che, dopo la vaccinazione COVID obbligatoria, aveva tutti i tipi di malattie batteriche che non aveva mai avuto prima. (Questa storia è stata un importante impulso alla mia apertura e alla crescita di questo sottostack).

Infine, abbiamo la conferma scientifica che **la vaccinazione contro il COVID-19 provoca una marcata diminuzione dell'immunità a agenti patogeni eterologi** come *virus, batteri e funghi*. Questa *diminuzione dell'immunità ad altri agenti patogeni* (deficit immunitario acquisito) è ciò che le persone si riferiscono colloquialmente come "VAIDS". (VAIDS sta per Vaccine-Acquired Immune Deficiency Syndrome)

Lo studio intitolato [BNT162b2 vaccinazione COVID-19 nei bambini altera le risposte delle citochine a patogeni eterologi e agonisti del recettore Toll-like](#), destinato a misurare la qualità delle risposte immunitarie generali nei bambini vaccinati con il vaccino Pfizer COVID.

ORIGINAL RESEARCH article

Front. Immunol., 25 August 2023

Sec. Vaccines and Molecular Therapeutics

Volume 14 - 2023 |

<https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1242380>

This article is part of the Research Topic

Vaccine-induced innate immunity and its role in viral infections

[View all Articles >](#)

BNT162b2 COVID-19 vaccination in children alters cytokine responses to heterologous pathogens and Toll-like receptor agonists

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1242380/full>

Campioni di sangue di 29 bambini, di età compresa tra 5 e 11 anni, sono stati prelevati prima della PRIMA dose di vaccinazione COVID e successivamente ripresi il 28° giorno dopo la seconda dose.

Metodi: è stato utilizzato un **test di stimolazione del sangue intero** per studiare le risposte delle citochine *in vitro* agli stimolanti eterologi (patici uccisi, leganti del recettore Toll-like) e agli antigeni SARS-CoV-2. *Sono stati analizzati* campioni di 29 bambini, di età compresa tra 5-11 anni, *prima e 28 giorni dopo una seconda vaccinazione BNT162b2 (V2 + 28)*. I campioni di otto bambini sono stati analizzati sei mesi dopo la vaccinazione BNT162b2.

Nell'introduzione, gli scienziati hanno detto con riacezione che la vaccinazione "ha alterato le risposte delle citochine". Come scopriremo, i colpi hanno alterato le risposte immunitarie in peggio, non meglio!

Conclusioni: la vaccinazione BNT162b2 nei bambini altera le risposte delle citochine agli stimolanti eterologi, in particolare un mese dopo la vaccinazione. Questo studio è il primo a segnalare gli effetti eterologi eterologi della vaccinazione COVID-19 nei bambini.

Cosa hanno fatto gli scienziati

Raccolta di campioni

Ai partecipanti è stato chiesto di fornire campioni di sangue in due visite principali e una visita facoltativa. Il primo campione di sangue è stato prelevato immediatamente prima e lo stesso giorno della prima vaccinazione BNT162b2 (V1), il secondo campione di sangue è stato prelevato 28 giorni dopo la seconda vaccinazione BNT162b2 (V2 + 28) e il terzo campione di sangue opzionale è stato prelevato 6 mesi dopo la seconda vaccinazione BNT162b2 (V2 + 182) ([Figura supplementare S1](#)). Fino a 23 ml di sangue venoso sono stati raccolti in tubi separatori di sodio contenenti eparina e siero (Becton Dickinson, NJ, USA).

Quindi, il sangue raccolto è stato testato per la risposta immunitaria a vari agenti patogeni, tra cui vari batteri comunemente incontrati, staphylococcus aureus e lievito patogeno [Candida Albicans](#):

Stimolazione del sangue intero in vitro

I saggi di stimolazione del sangue intero in vitro sono stati eseguiti come descritto in precedenza (16, 23). [dettagli del lavoro di laboratorio omessi - I.C.] ... Altri stimolanti sono stati precedentemente descritti (16) e inclusi: *stimolanti batterici* (haemophilus influenzae tipo B ucciso dal calore, HK Listeria monocytogenes, BCG-Danimarca, HK *Staphylococcus aureus* e HK Escherichia coli, e virali/altri stimolanti (antigene di superficie del virus dell'epatite B, ..., HK Candida albicans

Molti dei suddetti sono agenti patogeni che incontriamo spesso, e sono la ragione per cui abbiamo un sistema immunitario dato da Dio per tenerli lontani, cosa che i bambini sani in genere fanno.

Sfortunatamente, i 29 bambini vaccinati dal COVID di età compresa tra 5 e 11 anni, avevano ridotto notevolmente le risposte immunitarie 28 giorni dopo la seconda dose di Pfizer. Molte reazioni immunitarie specifiche sono diminuite di un fattore di oltre dieci volte:

(i grafici nella figura sopra utilizzano una *scala logaritmica*)

Gli autori affermano:

A seguito di stimolazione eterologa batterica, fungina e agonista

virale/TLR, **c'è stata una diminuzione generale delle risposte delle citochine e delle chemochine** nei bambini tra V1 e V2 + 28. Le maggiori diminuzioni sono state osservate per IFN- γ e MCP-1 ([Figure 2, 3A-C](#)). IL-6, IL-15, IL-17 sono diminuiti anche tra V1 e V2 + 28 a seguito di stimolazione con BCG, *H. influenzae*, *S. aureus*, antigene dell'epatite B, poli(I:C) e R848 ([Figura 3B](#)). La stimolazione di *monocitogenes* indotta da IL-15, TNF- α e IP-10 diminuisce tra V1 e V2 + 28 ([Figura 3C](#)). Le risposte IL-8 sono diminuite anche tra V1 e V2 + 28 in seguito alla stimolazione di *H. influenzae* e *S. aureus*.

Le risposte ridotte allo *Staphylococcus aureus* sono molto gravi: questa malattia è difficile da trattare e causa danni incalcolabili. Salterò le foto peggiori per non sconvolgere troppo i miei lettori.

In ogni caso, una diminuzione delle risposte immunitarie avviene su tutta la linea.

Nel mondo ideale, scienziati attenti, caute autorità sanitarie pubbliche e medici di principio studierebbero gli effetti dei vaccini COVID *prima di vaccinare decine di milioni di bambini e miliardi di adulti*. Se avessero

studiato e fatto la scienza di base (come lo studio sopra) prima di imporre e iniettare vaccini COVID, iniezioni così pericolose non sarebbero mai state date a bambini e giovani adulti!

Invece, nella folle corsa a "vaccinare il mondo" con vaccini che non funzionano nemmeno, abbiamo rovinato le risposte immunitarie di milioni di bambini e probabilmente di tutte le altre persone vaccinate.

I titoli sull'"aumento inspiegabile dei bambini infetti" con i batteri sopra menzionati abbondano:

Invece di un'attenta considerazione, le autorità scientifiche e sanitarie hanno negato tutto e si sono rifiutate di discutere. Ora che la verità sta venendo fuori, gli effetti negativi dei vaccini Covid non possono più essere invertiti. Molto sfortunato!

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

Conosci delle persone colpite? Per favore, condividi le tue storie, mentre sei MINDFUL SULLA PRIVACY!

[Condividi](#)